



ЗАТРИМАЙ ЧАС!

36

годин безперервного контролю над тиском^{1,2}



До складу Корпорації «Артеріум» входять АТ «Київмедпрепарат» та АТ «Галичфарм»

«Артеріум» Фармацевтична Корпорація
www.arterium.ua

Ближче до людей



Чим більша сила зв'язування БРА з АТ1-рецептором, тим більш виражений і тривалий гіпотензивний ефект має сартан⁴



КАСАРК® – контроль АТ до 36 годин¹

КАСАРК®

Діюча речовина: candesartan cilexetil; 1 таблетка містить кандесартану цилексетилу, у перерахуванні на 100% речовину, 8 мг; 16 мг або 32 мг. Фармакотерапевтична група. Антагоніст рецепторів ангіотензину II. Код АТХ С09С А06. Показання. Лікування есенціальної гіпертензії у дорослих. Лікування дорослих пацієнтів із серцевою недостатністю та порушенням систолическої функції лівого шлуночка (фракція викиду лівого шлуночка $\leq 40\%$) як додаткова терапія до інгібіторів АПФ або у випадках непереносимості інгібіторів АПФ. Протипоказання. Гіперчутливість до кандесартану цилексетилу або до будь-якої з допоміжних речовин. Порушення функції печінки тяжкого ступеня та/або холестази. Пацієнтам із цукровим діабетом або порушенням функції нирок (ШФФ < 60 мл/хв/1,73 м²) одночасне застосування кандесартану цилексетилу та препаратів, що містять аліскірен, протипоказане. Вагітні або жінки, які планують завагітніти. Побічні реакції. Лікування артеріальної гіпертензії. Побічні реакції при прийомі кандесартану легкі та транзиторні. Найчастішими небажаними реакціями були запаморочення/вертіго, головний біль та інфекції дихальних шляхів. Особливості застосування. Порушення функції нирок. Як і при застосуванні інших засобів, що гальмують реїн-ангіотензин-альдостеронову систему, можна очікувати зміни функції нирок у чутливих пацієнтів, які приймають кандесартану цилексетил. Відлугується за рецептом лікаря.

Р.П.: № UA/12457/01/03 необмежений з 14.07.2017; UA/12457/01/02 необмежений з 14.07.2017; UA/12457/01/01 необмежений з 14.07.2017.

* Активний метаболіт лозартану.

1. Lacourciere, Y., & Asmar, R. (1999). A comparison of the efficacy and duration of action of candesartan cilexetil and losartan as assessed by clinic and ambulatory blood pressure after a missed dose, in truly hypertensive patients* A placebo-controlled, forced titration study. American journal of hypertension, 12(12), 1181-1187 / Lacourciere, Y., & Asmar, R. (1999). Порівняння ефективності та тривалості дії кандесартану цилексетилу та лозартану, які було оцінено вимірюванням артеріального тиску в клініці і амбулаторно після пропущеної дози в пацієнтів з артеріальною гіпертензією. Плацебо контрольоване, форсоване титрацій дослідження. American journal of hypertension, 12(12), 1181-1187. 2. Mellan E. B., Jarvis V. Candesartan cilexetil plus hydrochlorothiazide combination. A Review of its use in hypertension // Drugs. – 2002. – Vol. 62. – № 5. – P. 787-816. / Mellan E. B., Jarvis V. Candesartan cilexetil in combination with hydrochlorothiazide. Огляд його використання при гіпертензії. // Drugs. – 2002. – Vol. 62. – № 5. – P. 787-816. 3. Інструкції для медичного застосування ЛЗ КАСАРК® 8 мг, 16 мг та 32 мг, КАСАРК® Н та КАСАРК® HD. Дата останнього перегляду матеріалу: 03.04.2019. 4. 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension. / 2013 ESH/ESC Рекомендації по лікуванню артеріальної гіпертензії. 5. 2012 Уніфікований клінічний протокол первинної, екстренної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги. Артеріальна гіпертензія.

Виробники: ПАТ «Київмедпрепарат» (01032, Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, 139) та Евертіджен Лайф Сенсаю Лімітед (Індія, Плот № Ес-8, Ес-9, Ес-13 та Ес-14, Ей Пі Ай Ай Сі, Фарма Ел Зет, Грін Індустріал Парк, Поленапі (ВІ), Сдчерла (ЕМ), Махабунгар, ІН – 509 301). Завантажи: ПАТ «Київмедпрепарат» (01032, Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, 139) та ТОВ «Органосін ЛТД» (04112, Україна, м. Київ, вул. Скорського, 8). Інформацію наведено в скороченому вигляді, повна інформація викладена в інструкції для медичного застосування лікарських засобів КАСАРК® 8 мг, 16 мг і 32 мг, КАСАРК® Н і КАСАРК® HD. Інформація виключно для медичних і фармацевтичних працівників. Для використання в професійній діяльності. Розповсюджується на спеціалізованих конференціях, семінарах, симпозиумах з медичної тематики. До складу Корпорації «Артеріум» входять ПАТ «Київмедпрепарат» та ПАТ «Галичфарм». Дата останнього перегляду інформаційного матеріалу: 09.12.2021 р.

КАСАРК® Н, КАСАРК® HD

Діючі речовини: candesartan cilexetil, hydrochlorothiazide; КАСАРК® Н: 1 таблетка містить кандесартану цилексетилу, у перерахуванні на 100% речовину, 16 мг та гідрохлортиазиду, у перерахуванні на 100% речовину, 12,5 мг; КАСАРК® HD: 1 таблетка містить кандесартану цилексетилу, у перерахуванні на 100% речовину, 32 мг та гідрохлортиазиду, у перерахуванні на 100% речовину, 25 мг. Фармакотерапевтична група. Комбіновані препарати інгібіторів ангіотензину II. Код АТХ С09D А06. Показання. Есенціальна гіпертензія у випадках, коли монотерапія кандесартану цилексетилом або гідрохлортиазидом є недостатньою. Протипоказання. Гіперчутливість до діючих речовин або до будь-якої з допоміжних речовин препарату або до похідних сульфаніламідів (гідрохлортиазид є похідним сульфаніламідів). Тяжка ниркова недостатність (кліренс креатиніну < 30 мл/хв/1,73 м² ППТ), тяжка печінкова недостатність та/або застоїв жовчі, стійка гіпокалемія або гіперкаліємія, подагра. Період вагітності або годування груддю. Дітячий вік до 18 років. Побічні реакції. Побічні реакції при прийомі кандесартану цилексетилу/гідрохлортиазиду легкі та тимчасові. Кандесартану цилексетилу/гідрохлортиазид, з боку нервової системи: запаморочення/вертіго. Кандесартану цилексетилу, з боку системи крові та лімфатичної системи: лейкопенія, нейтропенія та агранулоцитоз. Гідрохлортиазид, з боку системи крові та лімфатичної системи: лейкопенія, нейтропенія/агранулоцитоз, тромбоцитопенія, апластична анемія, пригнічення кісткового мозку, гемолітична анемія. Особливості застосування. Ниркова недостатність. Цій категорії пацієнтів бажано застосовувати петльові діуретики, а не тіазиди. При застосуванні препарату КАСАРК® Н, КАСАРК® HD пацієнтам з нирковою недостатністю рекомендується періодичний моніторинг рівнів калію, креатиніну та сечової кислоти в сироватці крові. Відлугується за рецептом лікаря. КАСАРК Н Р.П.: UA/19251/01/01 з 15.03.2022 по 15.03.2027, КАСАРК HD Р.П.: UA/19276/01/01 з 27.03.2022 по 27.03.2027.