

Покращення прогнозу у ваших руках



Показаний до застосування при:

- артеріальній гіпертензії;
- серцевих, печінкових та нефрогенних набряках;
- хронічній серцевій недостатності;
- нефрогенному нецукровому діабеті, коли виключаються інші лікувальні заходи

До складу Корпорації «Артеріум» входять АТ «Київмедпрепарат» та АТ «Галичфарм»

«Артеріум» Фармацевтична Корпорація
www.arterium.ua

Ближче до людей



ТАКЛОР® (хлорталідон) — тіазидоподібний діуретик з тривалістю дії до

72 ГОДИН³⁻⁴

Період напіввиведення

Тривалість дії

Гідрохлортіазид

6–15 год

до 12 год

Індапамід

14–24 год

до 24 год

Торасемід

3–4 год

до 12 год

Хлорталідон

40–60 год

48–72 год

Схеми застосування^{1,2}

Артеріальна
гіпертензія



Початкова доза:
12,5–50 мг добу



Підтримуюча доза:
25–50 мг через день

Серцева
недостатність
та набряки
специфічного
походження



Початкова доза:
50–100 мг добу



Підтримуюча доза:
25–50 мг в день

Дозування залежить від клінічної картини та відповіді пацієнта на терапію.

Тривалість застосування призначає лікар. Припиняють лікування шляхом поступового зменшення дози.

Діюча речовина: 1 таблетка містить хлорталідону — 25,0 мг. **Фармакотерапевтична група.** Діуретики. Нетіазидні сечогінні лікарські засоби з помірно вираженою активністю. Сульфонаміди прості. Хлорталідон. Код АТХ С03 ВА04. **Показання.** Лікування артеріальної гіпертензії; серцевих, печінкових та нефрогенних набряків; стабільної хронічної серцевої недостатності легкого або помірного ступеню; нефрогенного нецукрового діабету. **Протипоказання.** Відома гіперчутливість до хлорталідону, інших тіазидів та похідних сульфонаміду або до будь-якого з компонентів складу таблетки, анурія (діурез менше 100 мл/добу), виражена ниркова недостатність (кліренс креатиніну <30 мл/хв), гломерулонефрит, тяжка печінкова недостатність, гіперкальціємія, рефрактерна гіпокаліємія, або стани з підвищеною втраатою калію, виражена гіпонатріємія, симптоматична гіперурикемія. **Побічні реакції.** Найчастіше повідомляли про виникнення таких побічних реакцій (переважно при застосуванні високих доз): гіпокаліємія, гіперурикемія, підвищені рівня холестерину та ліпідів крові. Також частими побічними реакціями є: гіпонатріємія, гіпомagneмія та гіперглікемія та глюкозурія, погіршення перебігу захворювання у пацієнтів з цукровим діабетом, підвищення рівню сечовини та креатиніну (особливо на початку лікування), імпотенція, головний біль, запаморочення та слабкість, гіпотензія, ортостатична гіпотензія, відчуття серцебиття (пальпітація), втрата апетиту, сухість у роті, незначні шлунково-кишкові розлади, нудота, блювання, біль у верхній частині живота, запор і діарея, кропив'янка та інші форми шкірного висипання, свербіж, гіпотонія м'язів, м'язові судоми.

Література:

1. Інструкція для медичного застосування лікарського засобу Таклор, таблетки. 2. «Настанова з артеріальної гіпертензії» за редакції Коваленка В.М., Шевченко Є.П., Сиренка Ю.М, 2010, ст. 262-267. 3. Эффективная антигипертензивная терапия: в центре внимания хлорталидон. Medicine Review(кардиология) №2 (45), 2017. 4. Redefining diuretics use in hypertension: why select thiazide-like diuretic? Burnier et al. Journal of Hypertension, №8, August 2019, 1574-1586. Переосмислення використання діуретиків при гіпертензії: чому обрати тіазидоподібний діуретик? Burnier et al. Journal of Hypertension, №8, August 2019, 1574-1586.

ВІДПУСКАЄТЬСЯ ЗА РЕЦЕПТОМ ЛІКАРЯ. РІЛ: № UA/18560/01/01 від 11.02.2021 до 11.02.2026. Виробник: ПАТ «Київмедпрепарат», Україна, 01032, м. Київ, вул. Сагажанського, 139. Інформацію наведено в скороченому вигляді. Повна інформація викладена в Інструкції для медичного застосування лікарського засобу Таклор. Інформація виключно для медичних і фармацевтичних працівників. Для використання у професійній діяльності. Розповсюджується на спеціалізованих конференціях, семінарах, симпозиумах з медичної тематики. Дата останнього перегляду інформаційного матеріалу: 26.11.2021 р.