


КОЛИ ПОТРІБНА ПОДВІЙНА ДІЯ!



110/90



До складу Корпорації «Артеріум» входять АТ «Київмедпрепарат» та АТ «Галичфарм»

«Артеріум» Фармацевтична Корпорація
www.arterium.ua

Ближче до людей

 ARTERIUM

НЕБИАР® ПЛЮС має подвійний механізм дії³:

НЕБИАР® ПЛЮС



НЕБИВОЛОЛ

Селективно
блокує
 β_1 -адренорецептори



Знижує Артеріальний тиск



Знижує ЧСС^b


ГХТЗ^e

Блокування
реабсорбції іонів
натрію та хлору



**Зменшує об'єм
циркулюючої
крові**

За рахунок подвійного механізму дії **НЕБИАР® ПЛЮС**
до 90% пацієнтів досягають цільових цифр АТ^{d, 1}.



НЕБІАР® також можна використовувати у випадках специфічного ситуативного стресу:²



Емоційні симптоми

- ✓ Тривога
- ✓ Страх
- ✓ Важкість концентрації
- ✓ Утруднене засинання
- ✓ Безсоння




Соматичні симптоми

- ✓ Серцебиття, тремор, запаморочення, головний біль
- ✓ Болі у м'язах, напруження шиї та спини
- ✓ Головний біль

НЕБІАР® та **НЕБІАР® ПЛЮС**
на 35% доступніший за оригінальний небіволол^{4,5}



на **35%** ↓ доступніший



НЕБІВОЛОЛ

НЕБІВОЛОЛ+

НЕБИАР® ПЛЮС Алгоритм лікування

АГ^а 1 ступінь
140–159 мм рт.ст.

АГ^а 2 ступінь
160–179 мм рт.ст.

ЧСС^б ≥ 90

Приймає
чистий
небіволол

АБО

не приймає
жоден
β-блокатор



1 таблетка
НЕБИАР® ПЛЮС
вранці



В інших випадках
НЕБИАР®
САТ^с < 130 мм рт.ст. – ХСН^ф



НЕБИАР® ПЛЮС – досягнення цільового АТ^а та ЧСС^б за рахунок подвійного механізму дії.

Посилання:

- АГ – артеріальна гіпертензія.
- ЧСС – частота серцевих скорочень.
- САТ – систолічний артеріальний тиск.
- АТ – артеріальний тиск.
- ГХТЗ – гідрохлортизид.
- ХСН – хронічна серцева недостатність.

1. Ettore Malocco. Небіволол/гідрохлортизид: нова комбінація фіксованих доз для ефективного спрощеної антигіпертензивної терапії. High Blood Press Cardiovasc Prev 2008 Apr; DOI: 10.2165/00151642-200815020-00006.
2. Згідно настанови 007/29 МОЗ України. Тривалий розподіл <https://guidelines.moz.gov.ua/documents/5522>
3. Згідно інструкції до лікарського засобу Небіар Плюс.
4. Згідно з листом ТОВ «ПРОКСИМА РІСЕРЧ ІНТЕРНЕШНЛ» від 28 липня 2022 р. Вихідний номер № 2117.
5. Згідно з листом ТОВ «ПРОКСИМА РІСЕРЧ ІНТЕРНЕШНЛ» від 28 липня 2022 р. Вихідний номер № 2119.

НЕБИАР® ПЛЮС діюча речовина: небіволол, гідрохлортизид; 1 таблетка містить: небівололу (у формі небівололу гідрохлориду) – 5 мг; гідрохлортизиду – 12,5 мг. Селективні блокатори бета-адренорецепторів із тизанидими діуретиками. Код АТХ С07B B12. **Показання:** лікування есенціальної гіпертензії. **Протипоказання:** підвищена чутливість до діючих речовин або до інших компонентів лікарського засобу, підвищена чутливість до інших субстанцій, печінкова недостатність або порушення функції печінки; анурія, тяжка ниркова недостатність (коліренс креатиніну менше 30 мл/хв), гостра серцева недостатність. **Побічні реакції:** наведені окремо для кожної активної субстанції: Небіволол. Головний біль, запаморочення, парестезія. Запор, нудота, діарея. Підвищена втомированість, набряки. Гідрохлортизид. Ортостатична гіпотензія, суїхість у роті, нудота. Відбувається за рецептом лікаря. РП: № UA/17352/01/01 від 26.04.2019 до 26.04.2024. Виробник: АТ «Ківімедпрепарат» (виробництво (фасування) з продукції in bulk фірми-виробника Файн Фудс енд Фармасьютикалс Н.Т.М. С.П.А., Італія). Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності: Україна, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 139. Заявник: ТОВ «АРТЕРІУМ ЛТД». Місцезнаходження заявника: Україна, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 139.

НЕБИАР® діюча речовина: небіволол; 1 таблетка містить: небівололу (у формі небівололу гідрохлориду) – 5 мг. Селективні блокатори β-адренорецепторів. Код АТХ С07A B12. **Показання:** есенціальна артеріальна гіпертензія. Хронічна серцева недостатність легкого ступеня або помірного ступеня тяжкості, як доповнення до стандартних методів лікування хворих віком від 70 років. **Протипоказання:** підвищена чутливість до діючих речовин або до інших компонентів лікарського засобу; підвищена чутливість до інших субстанцій; печінкова недостатність або порушення функції печінки; анурія, тяжка ниркова недостатність (коліренс креатиніну менше 30 мл/хв), гостра серцева недостатність. **Побічні реакції:** головний біль, запаморочення, парестезія. Запор, нудота, діарея. Підвищена втомированість, набряки. Відбувається за рецептом лікаря. РП: № UA/17235/01/01 від 05.02.2019 до 05.02.2024. Виробник: АТ «Ківімедпрепарат» (виробництво з продукції in bulk фірми-виробника АКТАВІС ЛТД, Мальта, фірми-виробника «Валканфарма-Дуніца» АД, Болгарія). Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності: Україна, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 139. Заявник: ТОВ «АРТЕРІУМ ЛТД». Місцезнаходження заявника та/або представника заявника: Україна, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 139.

Інформація наведено в скороченому вигляді, повна інформація викладена в Інструкціях для медичного застосування лікарських засобів НЕБИАР® ПЛЮС і НЕБИАР®. Інформація виключно для медичних та фармацевтичних працівників. Для використання в професійній діяльності. Розповсюджується на спеціалізованих конференціях, семінарах, симпозіумах з медичної тематики. Дата останнього перегляду інформаційного матеріалу: 02.08.2022 р.